

明 細 書

SHC3、ATF6またはCREBL1のHtrA2による分解を阻害することによる神経細胞死阻害および神経変性疾患の改善方法

技術分野

[0001] 本発明は、SHC3(サーク ホモロジー 2 ドメイン コンテイニング トランスフォーミング プロテイン C3、src homology 2 domain containing transforming protein C3)、ATF6(アクティベーター トランスクリプション ファクター 6、activating transcription factor 6)およびCREBL1(サイクリックAMP レスポンス エレメント バインディング プロテイン ライク 1、cAMP responsive element binding protein-like 1)のうちの少なくとも1のHtrA2(ハイ テンパレイチャー リクワイアメント プロテイン A2、high temperature requirement protein A2)による分解の阻害に関する。より具体的には、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害することを特徴とする神経細胞死阻害方法、あるいは該分解を阻害する化合物を1つ以上用いることを特徴とする神経細胞死阻害方法に関する。また、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害することを特徴とする脳虚血障害または神経変性疾患の防止方法、治療方法または改善方法に関する。さらに、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害する化合物の同定方法に関する。また、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害する化合物を1つ以上含んでなる神経細胞死阻害剤に関する。さらに、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害する化合物を1つ以上含んでなる脳虚血障害または神経変性疾患の防止剤、治療剤または改善剤に関する。また、HtrA2、HtrA2をコードするポリヌクレオチドおよびHtrA2をコードするポリヌクレオチドを含有するベクターのうちの少なくともいずれか1と、SHC3、ATF6、CREBL1、並びにSHC3、ATF6およびCREBL1のいずれか1をコードするポリヌクレオチド、並びにSHC3、ATF6およびCREBL1のいずれか1をコードするポリヌクレオチドを含有するベクターのうちの少なくともいずれか1とを含んでなる

試薬キットに関する。

背景技術

- [0002] 生物は、細胞の生存とアポトーシス(細胞死)を調節することにより外界のストレスから身を守るが、生存とアポトーシス制御機構の調節の乱れによる過剰な細胞死は、種々の疾患を招く可能性がある(非特許文献1)。
- [0003] 近年、ストレスを感知し調節する場としてミトコンドリアや小胞体の研究が進み、ミトコンドリア膜に局在するHtrA2蛋白質(以下、HtrA2と称する)は、UVや熱ショック等のストレスによりミトコンドリア膜から細胞質へ移行し(非特許文献2-5)、カスパーゼ依存的な細胞死とカスパーゼ非依存的な細胞死の二つの細胞死を誘導することが報告された(非特許文献6)。HtrA2は、前駆体蛋白質(配列番号2)からN末133アミノ酸が切り離された成熟型(配列番号4)になり、ミトコンドリアから細胞質に移行する。成熟型HtrA2はプロテアーゼ活性を有する。以下、プロテアーゼ活性を有するHtrA2を活性型HtrA2と称することもある。
- [0004] カスパーゼ非依存的な細胞死は、HtrA2自身のセリンプロテアーゼとしての性質に依存し、その前駆体蛋白質のアミノ酸配列中306番目(成熟型においては174番目に相当する)のセリンをアラニンに置換したHtrA2変異体によりカスパーゼ非依存的な細胞死は引き起こされないことが知られている(非特許文献3-5)。かかるHtrA2変異体はプロテアーゼ活性を有さない。以下、プロテアーゼ活性を有さないHtrA2を不活性型HtrA2と称することもある。このようにHtrA2は、カスパーゼ非依存的な細胞死を誘導する機構において重要な役割を担う因子である。
- [0005] 以下に本明細書において引用した文献を列記する。
- 非特許文献1:「細胞工学」、2002年、第21巻、第4号、p. 360-394。
- 非特許文献2:ヤマグチ(H. Yamaguchi)ら、「キャンサー リサーチ(Cancer Research)」、2003年、第63巻、p. 1483-1489。
- 非特許文献3:スズキ(Y. Suzuki)ら、「モレキュラー セル(Molecular Cell)」、2001年、第8巻、p. 613-621。
- 非特許文献4:ヘッジ(R. Hegde)ら、「ザ ジャーナル オブ バイオロジカル ケミストリー(The Journal of Biological Chemistry)」、2002年、第277巻、p. 432

-438。

非特許文献5:マーチンズ(L. M. Martins)ら、「ザ ジャーナル オブ バイオロジカル ケミストリー(The Journal of Biological Chemistry)」、2002年、第277巻、p. 439-444。

非特許文献6:「実験医学」、2002年、第20巻、第1号、p. 73-75。

非特許文献7:コンティ(L. Conti)ら、「ネイチャー ニューロサイエンス(Nature Neuroscience)」、2001年、第4巻、p. 579-586。

非特許文献8:「生化学」、2001年、第73巻、第11号、p. 1322-1325。

非特許文献9:カウフマン(R. J. Kaufman)ら、「ザ ジャーナル オブ クリニカル インベスティゲーション(The Journal of Clinical Investigation)」、2002年、第110巻、p. 1389-1398。

非特許文献10:ハゼ(K. Haze)ら、「ザ バイオケミカル ジャーナル(The Biochemical Journal)」、2001年、第355巻、p. 19-28。

非特許文献11:ウルマー(K. M. Ulmer)、「サイエンス(Science)」、1983年、第219巻、p. 666-671。

非特許文献12:「ペプチド合成」、丸善株式会社、1975年。

非特許文献13:「ペプチド シンテシス(Peptide Synthesis)」、インターサイエンス(Interscience)、ニューヨーク(New York)、1996年。

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0006] これまでに神経変性疾患におけるカスパーゼ非依存的な細胞死についての報告が多数公表されている。一方、脳虚血においては、小胞体ストレスを介して神経細胞死が引き起こされることが報告されている。カスパーゼ非依存的な細胞死を誘導する機構において、HtrA2が重要な役割を担うと考えられている。これらからHtrA2が、神経変性疾患の新たな標的となる可能性が高く、また小胞体ストレスによる神経細胞死を阻害することは、新規な創薬標的になると考えられる。

[0007] 本発明の課題は、HtrA2によるカスパーゼ非依存的な細胞死の機構およびHtrA2の基質が未だ明らかになっていない状況において、HtrA2と相互作用する蛋白質

を見出し、HtrA2による該蛋白質の分解に基づく疾患の防止および／または治療を可能にする手段を提供することである。

課題を解決するための手段

- [0008] 上記課題を解決すべく本発明者らは鋭意努力し、HtrA2がCREBL1およびSHC1と相互作用することをインシリコ(in silico)で予測し、さらに活性型HtrA2によりCREBL1、CREBL1のファミリーであるATF6、およびSHC1のファミリーであるSHC3が分解されることを実験的に証明して本発明を完成した。
- [0009] すなわち本発明は、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害することを特徴とする神経細胞死阻害方法に関する。
- [0010] また本発明は、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害する化合物を1つ以上用いることを特徴とする神経細胞死阻害方法に関する。
- [0011] さらに本発明は、神経細胞死が脳虚血による神経細胞死である前記神経細胞死阻害方法に関する。
- [0012] さらにまた本発明は、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害することを特徴とする脳虚血障害または神経変性疾患の防止方法、治療方法または改善方法に関する。
- [0013] また本発明は、神経変性疾患がアルツハイマー病、パーキンソン病、ポリグルタミン病、プリオン病または筋萎縮性側索硬化症である前記防止方法、治療方法または改善方法に関する。
- [0014] さらに本発明は、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害する化合物の同定方法であって、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を可能にする条件下、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1とHtrA2とを化合物と接触させ、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1を検出することができるシグナルおよび／またはマーカーを使用する系を用いて、このシグナルおよび／またはマーカーの存在若しくは不存在および／または変化を検出することにより、化合物が、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1の分解を阻害するか否かを決定することを特徴とする同定方法に関する。

する。

- [0015] さらにまた本発明は、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害する化合物の同定方法であって、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を可能にする条件下、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1とHtrA2とを化合物と接触させ、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1の存在若しくは不存在の検出および／またはその量の変化の測定により、あるいは、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1の分解物の存在若しくは不存在の検出および／またはその量の変化の測定により、化合物が、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1の分解を阻害するか否かを決定することを特徴とする同定方法に関する。
- [0016] また本発明は、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害する化合物を1つ以上含んでなる神経細胞死阻害剤に関する。
- [0017] さらに本発明は、神経細胞死が脳虚血による神経細胞死である前記神経細胞死阻害剤に関する。
- [0018] さらにまた本発明は、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害する化合物を1つ以上含んでなる脳虚血障害または神経変性疾患の防止剤、治療剤または改善剤に関する。
- [0019] また本発明は、神経変性疾患がアルツハイマー病、パーキンソン病、ポリグルタミン病、プリオン病または筋萎縮性側索硬化症である前記神経変性疾患の防止剤、治療剤または改善剤に関する。
- [0020] さらに本発明は、HtrA2、HtrA2をコードするポリヌクレオチドおよびHtrA2をコードするポリヌクレオチドを含有するベクターのうちの少なくともいずれか1と、SHC3、ATF6、CREBL1、並びにSHC3、ATF6およびCREBL1のいずれか1をコードするポリヌクレオチド、並びにSHC3、ATF6およびCREBL1のいずれか1をコードするポリヌクレオチドを含有するベクターのうちの少なくともいずれか1とを含んでなる試薬キットに関する。

発明の効果

- [0021] 本発明によれば、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2に

よる分解を阻害することにより、これら蛋白質のうちの少なくとも1の減少または消失を阻害することができ、その結果、細胞死(例えば神経細胞の細胞死)の阻害並びに細胞死を伴う疾患(例えば脳虚血障害や神経変性疾患)の防止、治療または改善が可能になる。

[0022] SHC3は成熟した中枢神経細胞に特異的に発現し、神経細胞の分化と生存に重要な役割を果たしていると考えられる(非特許文献7および8)。ATF6およびCREBL1は、小胞体ストレスを感知してシャペロン遺伝子群の転写を誘導し、細胞における小胞体ストレスの回復とその生存に関与していると考えられている(非特許文献9および10)。これらから、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1がHtrA2により分解されて減少または消失することにより、ストレス等による細胞死、例えば神経細胞の細胞死が亢進すると考えられる。したがって、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害してその減少または消失を阻害することにより、細胞死(例えば神経細胞の細胞死)の阻害並びに細胞死を伴う疾患(例えば脳虚血障害や神経変性疾患)の防止、治療または改善が可能になる。

[0023] また本発明により、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害する化合物の同定方法を実施できる。本同定方法で得られた化合物は、細胞死(例えば神経細胞の細胞死)の阻害糖尿病の並びに細胞死を伴う疾患(例えば脳虚血障害や神経変性疾患)の防止、治療または改善に使用できる。

図面の簡単な説明

[0024] [図1-A]活性型HtrA2(成熟型HtrA2)によりCREBL1がインビトロで分解されたことを説明する図である。活性型HtrA2とCREBL1を1晩(O/N)反応させることにより、CREBL1を示すバンドが著しく減少した。一方、不活性型HtrA2(成熟型HtrA2(S306A))ではCREBL1の分解が認められなかった。(実施例2)

[0025] [図1-B]活性型HtrA2(成熟型HtrA2)によりATF6がインビトロで分解されたことを説明する図である。活性型HtrA2とATF6を4時間(4h)または1晩(O/N)反応させることにより、ATF6を示すバンドが著しく減少した。一方、不活性型HtrA2(成熟型HtrA2(S306A))ではATF6の分解が認められなかった。(実施例2)

[0026] [図1-C]活性型HtrA2(成熟型HtrA2)によりSHC3(p64)がインビトロで分解され

たことを説明する図である。活性型HtrA2とSHC3(p64)を4時間(4h)または1晩(O/N)反応させることにより、SHC3(p64)を示すバンドが著しく減少した。一方、不活性型HtrA2(成熟型HtrA2(S306A))ではSHC3(p64)の分解が認められなかった。(実施例2)

[0027] [図2-A]活性型HtrA2変異体(活性型HtrA2(成熟型HtrA2)のN末4アミノ酸残基を欠失させた成熟型HtrA2(Δ AVPS)または活性型HtrA2のN末のアラニンをグリシンに置換した成熟型HtrA2(GVPS))により、CREBL1が細胞内で分解されたことを説明する図である(上図)。成熟型HtrA2(Δ AVPS)または成熟型HtrA2(GVPS)とCREBL1とを共発現させた細胞を用いた解析では、CREBL1を示すバンドが著しく減少した(上図)。一方、不活性型HtrA2変異体(成熟型HtrA2 S306(Δ AVPS)または成熟型HtrA2 S306(GVPS))とCREBL1とを共発現させた細胞を用いた解析では、CREBL1を示すバンドの減少は認められなかった(上図)。細胞内における各HtrA2変異体の発現は、各細胞間でほとんど差がなかった(下図)。(実施例3)

[0028] [図2-B]活性型HtrA2変異体(活性型HtrA2(成熟型HtrA2)のN末4アミノ酸残基を欠失させた成熟型HtrA2(Δ AVPS)または活性型HtrA2のN末のアラニンをグリシンに置換した成熟型HtrA2(GVPS))により、ATF6が細胞内で分解されたことを説明する図である(上図)。成熟型HtrA2(Δ AVPS)または成熟型HtrA2(GVPS)とATF6とを共発現させた細胞を用いた解析では、ATF6を示すバンドが著しく減少した(上図)。一方、不活性型HtrA2変異体(成熟型HtrA2 S306(Δ AVPS)または成熟型HtrA2 S306(GVPS))とATF6とを共発現させた細胞を用いた解析では、ATF6を示すバンドの減少は認められなかった(上図)。細胞内における各HtrA2変異体の発現は、各細胞間でほとんど差がなかった(下図)。(実施例3)

[0029] [図2-C]活性型HtrA2変異体(活性型HtrA2(成熟型HtrA2)のN末4アミノ酸残基を欠失させた成熟型HtrA2(Δ AVPS)または活性型HtrA2のN末のアラニンをグリシンに置換した成熟型HtrA2(GVPS))により、SHC3(p64)が細胞内で分解されたことを説明する図である(上図)。成熟型HtrA2(Δ AVPS)または成熟型HtrA2(GVPS)とSHC3(p64)とを共発現させた細胞を用いた解析では、SHC3(p64)を

示すバンドが著しく減少した(上図)。一方、不活性型HtrA2変異体(成熟型HtrA2 S306(Δ AVPS)または成熟型HtrA2 S306(GVPS))とSHC3(p64)とを共発現させた細胞を用いた解析では、SHC3(p64)を示すバンドの減少は認められなかった(上図)。細胞内における各HtrA2変異体の発現は、各細胞間でほとんど差がなかった(下図)。(実施例3)

[0030] [図2-D]活性型HtrA2変異体(活性型HtrA2(成熟型HtrA2)のN末4アミノ酸残基を欠失させた成熟型HtrA2(Δ AVPS)または活性型HtrA2のN末のアラニンをグリシンに置換した成熟型HtrA2(GVPS))により、SHC3(p52)が細胞内で分解されたことを説明する図である(上図)。成熟型HtrA2(Δ AVPS)または成熟型HtrA2(GVPS)とSHC3(p52)とを共発現させた細胞を用いた解析では、SHC3(p52)を示すバンドが著しく減少した(上図)。一方、不活性型HtrA2変異体(成熟型HtrA2 S306(Δ AVPS)または成熟型HtrA2 S306(GVPS))とSHC3(p52)とを共発現させた細胞を用いた解析では、SHC3(p52)を示すバンドの減少は認められなかった(上図)。細胞内における各HtrA2変異体の発現は、各細胞間でほとんど差がなかった(下図)。(実施例3)

[0031] [図3-A]蛋白質内部のリジン残基がビオチン化され且つN末にTagが付加されたCREBL1を用いて、ビオチンを検出することにより、活性型HtrA2(成熟型HtrA2)によるCREBL1の分解が検出されたことを説明する図である。活性型HtrA2とCREBL1を4時間(4h)または1晩(O/N)反応させることにより、ビオチン化CREBL1を示すバンドが著しく減少し、50kDa近辺にCREBL1分解産物を示すと考えられるバンドが検出された。一方、不活性型HtrA2(成熟型HtrA2(S306A))ではCREBL1の分解が認められず、上記50kDa近辺のバンドも検出されなかった。(実施例4)

[0032] [図3-B]蛋白質内部のリジン残基がビオチン化され且つN末にTagが付加されたSHC3(p64)を用いて、ビオチンを検出することにより、活性型HtrA2(成熟型HtrA2)によるSHC3(p64)の分解が検出されたことを説明する図である。活性型HtrA2とSHC3(p64)を4時間(4h)または1晩(O/N)反応させることにより、ビオチン化SHC3(p64)を示すバンドが著しく減少し、70kDa、40kDaおよび30kDa近辺にSHC3(p64)分解産物を示すと考えられるバンドが検出された。一方、不活性型HtrA2(成

熟型HtrA2(S306A))ではSHC3(p64)の分解が認められず、上記70kDa、40kDaおよび30kDa近辺のバンドも検出されなかった。(実施例4)

[0033] [図3-C]蛋白質内部のリジン残基がビオチン化され且つN末にTagが付加されたSHC3(p52)を用いて、ビオチンを検出することにより、活性型HtrA2(成熟型HtrA2)によるSHC3(p52)の分解が検出されたことを説明する図である。活性型HtrA2とSHC3(p52)を1晩(O/N)反応させることにより、ビオチン化SHC3(p52)を示すバンドが著しく減少したが、SHC3(p52)分解産物を示すと考えられるバンドは検出されなかった。一方、不活性型HtrA2(成熟型HtrA2(S306A))ではSHC3(p52)の分解が認められなかった。(実施例4)

[0034] [図4-A]蛋白質内部のリジン残基がビオチン化され且つN末にTagが付加されたCREBL1を用いて、N末に付加されたTagを検出することにより、活性型HtrA2(成熟型HtrA2)によりCREBL1が分解されたことを説明する図である。活性型HtrA2とCREBL1を4時間(4h)または1晩(O/N)反応させることにより、N末にTagが付加されたCREBL1を示すバンドが著しく減少した。図3で検出された50kDa近辺のCREBL1分解産物を示すと考えられるバンドは、抗Tag抗体では検出されなかった。一方、不活性型HtrA2(成熟型HtrA2(S306A))ではCREBL1の分解が認められなかった。(実施例4)

[0035] [図4-B]蛋白質内部のリジン残基がビオチン化され且つC末にTagが付加されたSHC3(p64)を用いて、C末に付加されたTagを検出することにより、活性型HtrA2(成熟型HtrA2)によりSHC3(p64)が分解されたことを説明する図である。活性型HtrA2とSHC3(p64)を4時間(4h)または1晩(O/N)反応させることにより、C末にTagが付加されたSHC3(p64)を示すバンドが著しく減少し、70kDa、40kDaおよび30kDa近辺にSHC3(p64)分解産物を示すと考えられるバンドが検出された。一方、不活性型HtrA2(成熟型HtrA2(S306A))ではSHC3(p64)の分解は認められなかった。(実施例4)

[0036] [図4-C]蛋白質内部のリジン残基がビオチン化され且つC末にTagが付加されたSHC3(p52)を用いて、C末に付加されたTagを検出することにより、活性型HtrA2(成熟型HtrA2)によりSHC3(p52)が分解されたことを説明する図である。活性型Htr

A2とSHC3(p52)を1晩(O/N)反応させることにより、C末にTagが付加されたSHC3(p52)を示すバンドが著しく減少し、40kDa近辺にSHC3(p52)分解産物を示すと考えられるバンドが検出された。一方、不活性型HtrA2(成熟型HtrA2(S306A))ではSHC3(p52)の分解は認められなかった。(実施例4)

発明を実施するための最良の形態

- [0037] 本発明は、参照によりここに援用されるところの、日本特許出願番号第2003-342588号からの優先権を主張するものである。
- [0038] 本明細書においては単離された若しくは合成の完全長蛋白質;単離された若しくは合成の完全長ポリペプチド;または単離された若しくは合成の完全長オリゴペプチドを意味する総称的用語として「ポリペプチド」という用語を使用することがある。ここで蛋白質、ポリペプチド若しくはオリゴペプチドはペプチド結合または修飾されたペプチド結合により互いに結合している2個以上のアミノ酸を含むものである。以降、アミノ酸を表記する場合、1文字または3文字にて表記することがある。
- [0039] 本発明においては、HtrA2がCREBL1およびSHC1と相互作用することを、国際公開WO01/67299号パンフレット記載の方法に従ってインシリコで予測した。さらに実験的に、HtrA2によりCREBL1、CREBL1のファミリーであるATF6、およびSHC1のファミリーであるSHC3が分解されることを初めて明らかにした。
- [0040] SHC3は、N-ShcあるいはShcCとも称され、成熟した中枢神経細胞に特異的に発現している。SHC3は、神経栄養因子(NGFやEGF等)により活性化されたレセプターチロシンキナーゼであるTrkファミリー(Trk family)からのシグナルを伝達し、PI3K-Akt-Bad経路を通じて神経細胞の分化と生存に重要な役割を果たしていると考えられている。またSHC3のSHドメインのみ(dominant negative)を発現させた細胞では、細胞死が引き起こされ、神経突起の伸長が妨げられることが報告されている(非特許文献7および8)。
- [0041] CREBL1は、ATF6ファミリーの1つであり、ATF6 β とも称される。CREBL1は小胞体に局在し、小胞体ストレスによりS1P、S2Pによりプロセッシングを受けて一部が核移行し、転写因子として働くことが知られている。
- [0042] CREBL1およびATF6はいずれも、小胞体ストレスを感知してシャペロン遺伝子群

の転写を誘導することによりストレスに対する細胞の回復と生存に寄与することが知られている(非特許文献9および10)。また、小胞体ストレスと神経変性疾患の関連性がいくつかの論文で報告されている(非特許文献1)。

[0043] これらから、神経細胞において過剰なストレス(例えば小胞体ストレス)により活性化されたHtrA2により、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1が分解されて減少または消失することにより、神経細胞の分化・生存シグナル経路の破綻が生じ、その結果、神経細胞死が亢進されると考える。

[0044] したがって、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害することにより細胞死を阻害できる。さらに、SHC3、ATF6またはCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害することにより細胞死を伴う疾患の防止および／または治療が可能になる。例えば、SHC3、ATF6またはCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害することにより、神経細胞の細胞死、例えば小胞体ストレスによる神経細胞死を阻害できる。さらには神経細胞死を伴う疾患、例えば神経変性疾患や脳虚血障害の防止、治療または改善が可能になる。また、SHC3、ATF6またはCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解の阻害剤は、神経変性疾患や脳虚血障害の治療薬になる可能性が考えられる。

[0045] これら知見に基づいて本発明においては、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解の阻害方法を提供する。さらに、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害することを特徴とする神経細胞死阻害方法を提供する。本発明に係る神経細胞死阻害方法は、好ましくはインビトロで実施することができる。本発明においてはまた、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1の分解に基づく疾患の防止方法、治療方法または改善方法を提供する。

[0046] SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解の阻害はHtrA2の作用を阻害することにより実施できる。例えば、SHC3、ATF6またはCREBL1とHtrA2の相互作用を阻害することにより実施できる。あるいは、HtrA2の酵素活性を阻害することにより実施できる。好ましくは、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1とHtrA2とを含む生体外試料において、HtrA2の作用を阻害する

ことによりSHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害できる。ここでは、このような阻害効果を有する物質（後述する例として競合阻害効果を有するポリペプチド類、抗体および低分子化合物等が挙げられる）を阻害剤と称する。また、本明細書中で、「SHC3、ATF6またはCREBL1とHtrA2が相互作用する」とは、SHC3、ATF6またはCREBL1とHtrA2がある様式により互いに作用を及ぼし、その結果、具体的にはSHC3、ATF6またはCREBL1がHtrA2により分解されることを意味する。前記「ある様式」とは、結合、接触あるいは近接等を含むものであり、結果として互いに作用を及ぼし得る様式であればいずれのものであってもよい。

- [0047] SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解の阻害は具体的には、SHC3、ATF6またはCREBL1とHtrA2の相互作用を阻害する化合物を用いて実施できる。かかる化合物として、SHC3、ATF6、CREBL1またはHtrA2の各アミノ酸配列においてSHC3、ATF6またはCREBL1とHtrA2が相互作用する部位のアミノ酸配列からなるポリペプチドを例示できる。特に、HtrA2の基質となるSHC3、ATF6またはCREBL1由来のかかるポリペプチドは、SHC3、ATF6またはCREBL1とHtrA2の蛋白質間相互作用を競合的に阻害し、HtrA2によるこれら各蛋白質の分解を阻害できる。このようなポリペプチドは、HtrA2、SHC3、ATF6またはCREBL1のアミノ酸配列から設計し、自体公知のペプチド合成法により合成したものから、SHC3、ATF6またはCREBL1のHtrA2による分解を阻害するものを選択することにより取得できる。SHC3、ATF6またはCREBL1のHtrA2により分解される部位のアミノ酸配列からなるポリペプチドは、かかるポリペプチドとして好適である。このように特定されたポリペプチドに、1個乃至数個のアミノ酸の欠失、置換、付加または挿入等の変異を導入したものも本発明の範囲に包含される。このような変異を導入したポリペプチドは、SHC3、ATF6またはCREBL1のHtrA2による分解を阻害するものが好ましい。変異を有するポリペプチドは天然に存在するものであってよく、また変異を導入したものであってもよい。欠失、置換、付加または挿入等の変異を導入する手段は自体公知であり、例えばウルマー (Ulmer) の技術 (非特許文献11) を利用して実施できる。このような変異の導入において、当該ポリペプチドの基本的

な性質(物性、機能または免疫学的活性等)を変化させないという観点から、例えば、同族アミノ酸(極性アミノ酸、非極性アミノ酸、疎水性アミノ酸、親水性アミノ酸、陽性荷電アミノ酸、陰性荷電アミノ酸および芳香族アミノ酸等)の間での相互の置換は容易に想定される。さらに、これら利用できるポリペプチドは、その構成アミノ基またはカルボキシル基等を、例えばアミド化修飾する等、機能の著しい変更を伴わない程度に改変できる。

[0048] 上記ポリペプチドは、ペプチド化学において知られる一般的な方法で製造できる。例えば、成書(非特許文献12および13)に記載の方法が例示されるが、これらに限らず公知の方法が広く利用できる。具体的には、通常の液相法および固相法によるペプチド合成法、例えばFmoc法等が挙げられる。または市販のアミノ酸合成装置を用いて上記ポリペプチドを製造できる。あるいは遺伝子工学的手法により上記ポリペプチドを取得することもできる。例えば目的とするポリペプチドをコードする遺伝子を宿主細胞中で発現できる組換え発現ベクターを作成し、これを適当な宿主細胞、例えば大腸菌にトランスフェクションして形質転換した後に該形質転換体を培養し、次いで得られる培養物から目的とするポリペプチドを回収することにより製造できる。

[0049] SHC3、ATF6またはCREBL1のHtrA2による分解の阻害は、HtrA2、SHC3、ATF6またはCREBL1を認識する抗体であって、SHC3、ATF6またはCREBL1のHtrA2による分解を阻害する抗体を用いることによっても実施できる。かかる抗体は、HtrA2、SHC3、ATF6またはCREBL1自体、あるいはSHC3、ATF6またはCREBL1とHtrA2が相互作用する部位のアミノ酸配列からなるポリペプチドを抗原として自体公知の抗体作製法により取得できる。

[0050] SHC3、ATF6またはCREBL1のHtrA2による分解の阻害は、HtrA2の酵素活性を阻害する化合物、好ましくは特異的に阻害する化合物により実施できる。かかる化合物は、例えば、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1を基質として、HtrA2による当該基質の分解を阻害するものを同定することにより取得できる。HtrA2を特異的に阻害するとは、HtrA2を強く阻害するが、他の酵素は阻害しないか、弱く阻害することを意味する。

[0051] SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害す

る化合物の同定方法は、自体公知の医薬品スクリーニングシステムを利用して構築できる。例えば、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を可能にする条件を選択し、当該条件下でSHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1および／またはHtrA2を、調べようとする化合物(被検化合物)と接触させ、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1の分解を検出し得るシグナルおよび／またはマーカーを使用する系を用いて、このシグナルおよび／またはマーカーの存在若しくは不存在または変化を検出することにより、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害する化合物を同定できる。SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を可能にする条件は、インビトロのものであってもよく、インビボのものであってもよい。例えば、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1とHtrA2とを共発現させた細胞を用いることもできる。細胞における共発現は、SHC3、ATF6またはCREBL1をコードするポリヌクレオチドを含む適当なベクターとHtrA2をコードするポリヌクレオチドを含む適当なベクターとを用いて慣用の遺伝子工学的手法でこれらを細胞にトランスフェクションすることにより達成できる。SHC3、ATF6またはCREBL1をコードするポリヌクレオチドを含むベクターは、単独で用いることができるし、組合せて用いることもできる。細胞は、真核細胞、好ましくは動物細胞、より好ましくは動物培養細胞株、さらに好ましくは哺乳動物培養細胞株を用いることができる。SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1および／またはHtrA2と被検化合物との接触は、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解の反応以前に行なってもよいし、該分解の反応に共存させることにより行なってもよい。ここでマーカーとは、それ自体は物理的または化学的性質により検出され得ないが、化学的反応を経ることにより前記シグナルを生成させるものであって、該生成されるシグナルの物理的、化学的または生物学的性質を指標として間接的に検出され得るものを指す。シグナルおよび／またはマーカーとして、レポーター遺伝子(例えばクロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼ遺伝子等)、放射性同位体、タグペプチド類(His-tag、Myc-tag、HA-tag、FLAG-tagまたはXpress-tag等)、GST等の酵素類、ビオチン、および蛍光蛋白質等、公知のものが利用できるが、これら例示に限

らず、一般的に化合物の同定方法に用いられている標識物質であれば、いずれも利用できる。これらシグナルおよび／またはマーカーの検出方法は当業者には周知である。簡便には、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1の分解は、これら蛋白質またはこれら蛋白質の分解物の存在若しくは不存在の検出および／またはその量の変化の検出により測定できる。これら蛋白質量またはこれら蛋白質の分解物量の定量は、自体公知の蛋白質またはペプチドの検出方法、例えばウェスタンブロットリング等を用いて実施できる。

[0052] HtrA2、SHC3、ATF6およびCREBL1はいずれも公知蛋白質であり、ジェンバンク (GenBank) にそれぞれアクセッションナンバーNM_013247、NM_016848、NM_007348およびNM_00438として開示されている。

[0053] 本実施例において用いたHtrA2のアミノ酸配列を配列番号4に示す。また、配列番号4に記載のアミノ酸配列をコードするHtrA2 DNAの塩基配列を配列番号3に示す。配列番号4に記載のアミノ酸配列で表されるポリペプチドは、成熟型HtrA2である。成熟型HtrA2とは、HtrA2前駆体蛋白質 (配列番号2) からN末133アミノ酸残基が切り離されて生じた成熟型蛋白質であり、プロテアーゼ活性を有する。以下、プロテアーゼ活性を有するHtrA2を活性型HtrA2と呼称することがある。また、活性型HtrA2として、成熟型HtrA2のN末の4残基 (AVPS) を欠失させた蛋白質 (配列番号8、成熟型HtrA2 (Δ AVPS) と称することがある) または成熟型HtrA2のN末の4残基のうちのアラニンをグリシンに置換した蛋白質 (配列番号10、成熟型HtrA2 (GVPS) と称することがある) を用いることができる。このような変異を導入したHtrA2は、そのプロテアーゼ活性には変化がないため、活性型HtrA2として用いることができる。一方、プロテアーゼ活性を有さないHtrA2を不活性型HtrA2と呼称することがある。不活性型HtrA2として、HtrA2のアミノ酸配列においてHtrA2のプロテアーゼ活性に必要な部位のアミノ酸残基に変異を有し、該変異の結果プロテアーゼ活性を示さないHtrA2変異体が例示できる。HtrA2のプロテアーゼ活性に必要な部位として、プロテアーゼ活性ドメイン、より好ましくは成熟型HtrA2 (配列番号4) の174番目 (前駆体蛋白質 (配列番号2) では306番目に相当) のセリン残基が挙げられる。不活性型HtrA2として、より具体的には、成熟型HtrA2の174番目 (前駆体蛋白質 (

配列番号2)では306番目に相当)のセリン残基がアラニンに置換したHtrA2変異体(配列番号6、成熟型HtrA2(S306A)と呼称する)が例示できる。また、不活性型HtrA2として、成熟型HtrA2(S306A)のN末の4残基(AVPS)を欠失させた蛋白質(配列番号12、成熟型HtrA2(S306A、 Δ AVPS)と称することがある)または成熟型HtrA2のN末の4残基のうちのアラニンをグリシンに置換した蛋白質(配列番号14、成熟型HtrA2(S306A、GVPS)と称することがある)を用いることができる。

[0054] 本実施例において用いたSHC3のアミノ酸配列を配列番号16に示す。以下、配列番号16に記載のアミノ酸配列で表されるSHC3蛋白質を、SHC3(p64)と称することがある。また、SHC3(p64) DNAの塩基配列を配列番号15に示す。配列番号15に記載の塩基配列は、アクセッションナンバーNM_016848に開示されたSHC3の塩基配列と比較して6つの塩基に相違が認められた(実施例2参照)。また、本発明においては、SHC3のスプライシングバリエントであるSHC3(p52)を使用した。SHC3(p52)は、SHC3遺伝子のコード領域内の2番目のATG(1番目のATGより360base下流)からコードされる蛋白質である。

[0055] 本実施例において用いたATF6のアミノ酸配列を配列番号20に示す。また、ATF6 DNAの塩基配列を配列番号19に示す。配列番号19に記載の塩基配列は、アクセッションナンバーNM_007348に開示されたATF6の塩基配列と比較して15個の塩基に相違が認められた(実施例2参照)。

[0056] 本実施例において用いたCREBL1の塩基配列を配列番号18に示す。また、CREBL1 DNAの塩基配列を配列番号17に示す。配列番号17に記載の塩基配列は、アクセッションナンバーNM_00438に開示されたCREBL1の塩基配列と比較して塩基の1つに相違が認められた(実施例2参照)。

[0057] 本発明においてHtrA2、SHC3、ATF6およびCREBL1並びにこれら各蛋白質をコードする各遺伝子は、上記例示したアミノ酸配列または塩基配列で表される蛋白質または遺伝子に限定されず、一般的に報告されているHtrA2、SHC3、ATF6およびCREBL1をいずれも含む。

[0058] 本発明において使用するHtrA2、SHC3、ATF6およびCREBL1は、これらを遺伝子工学的手法で発現させた細胞や生体試料から調製したもの、無細胞系合成産

物または化学合成産物であつてよく、あるいはこれらからさらに精製されたものであつてもよい。また、HtrA2、SHC3、ATF6およびCREBL1のいずれか1を遺伝子工学的手法で発現させた細胞を使用することもできる。HtrA2、SHC3、ATF6およびCREBL1は、SHC3、ATF6またはCREBL1とHtrA2との相互作用、およびこれら蛋白質の機能、例えばHtrA2のプロテアーゼ活性やSHC3、ATF6およびCREBL1の酵素基質としての性質等に影響がなければ、N末側やC末側に別の蛋白質やポリペプチドを、直接的にまたはリンカーペプチド等を介して間接的に、遺伝子工学的手法等を用いて付加したものであつてもよい。付加する別の蛋白質やポリペプチドとして、 β -ガラクトシダーゼ、IgG等の免疫グロブリンFc断片、tagペプチド類(His-tag、Myc-tag、HA-tag、FLAG-tag、またはXpress-tag等)を例示できる。

[0059] HtrA2、SHC3、ATF6またはCREBL1をコードするポリヌクレオチドは、ヒトcDNAライブラリーから自体公知の遺伝子工学的手法により調製できる。HtrA2、SHC3、ATF6またはCREBL1をコードするポリヌクレオチドを含有するベクターは、当該ポリヌクレオチドを適当な発現DNAベクター、例えば細菌プラスミド由来のベクターに自体公知の遺伝子工学的手法で導入することにより得られる。

[0060] 被検化合物として、例えば化学ライブラリーや天然物由来の化合物、あるいはHtrA2、SHC3、ATF6またはCREBL1の一次構造や立体構造に基づいてドラッグデザインして得られた化合物等が挙げられる。その他、SHC3、ATF6またはCREBL1のHtrA2により分解される部位のアミノ酸配列からなるポリペプチドの構造に基づいてドラッグデザインして得られた化合物等も被検化合物として好適である。

[0061] 本発明に係る化合物の同定方法は具体的には、例えば、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1とHtrA2とを用いたインビトロにおけるプロテアーゼアッセイ(実施例2)に被検化合物を添加することにより実施できる。活性型である成熟型HtrA2は、ヒト腎臓cDNAライブラリーから自体公知の遺伝子工学的手法により取得した成熟型HtrA2 DNAを含む適当なベクターをトランスフェクションした大腸菌から調製できる。SHC3は、ヒト脳cDNAライブラリーから自体公知の遺伝子工学的手法により取得したSHC3 DNAを含む適当なベクターをトランスフェクションした動物細胞培養株(例えばHEK293T細胞)から調製できる。CREBL1は、ヒト脳cDNAラ

イブラリーから自体公知の遺伝子工学的手法により取得したCREBL1 DNAを含む適当なベクターをトランスフェクションした動物細胞培養株(例えばHEK293T細胞)から調製できる。ATF6は、ヒト乳腺cDNAライブラリーから自体公知の遺伝子工学的手法により取得したATF6 DNAを含む適当なベクターをトランスフェクションした動物細胞(例えばHEK293T細胞)から調製できる。SHC3、CREBL1、ATF6およびHtrA2は、これら蛋白質をそれぞれ発現させた各細胞の細胞溶解液の可溶性画分に含まれる。SHC3、ATF6およびCREBL1は、好ましくは、それらのN末またはC末にタグペプチド等が付加された蛋白質として発現させ、該タグペプチドに対する抗体で免疫沈降することにより精製して用いることが適当である。例えば、タグペプチドに対する抗体で免疫沈降した後、樹脂(プロテインG セファロース等)等に補足したものを使用できる。インビトロにおけるプロテアーゼアッセイは、樹脂等に補足したSHC3、CREBL1またはATF6に、成熟型HtrA2を添加して37℃で一晩反応させた後、これら蛋白質をウエスタンブロッティングで検出することにより実施できる。SHC3およびATF6については、37℃で4時間反応させることにより成熟型HtrA2により分解されるため、プロテアーゼアッセイにおける反応時間を4時間にすることもできる。ウエスタンブロッティングによる検出は、SHC3、CREBL1またはATF6に付加させたタグペプチドに対する抗体を用いて実施できる。SHC3、CREBL1またはATF6はHtrA2により分解されるため、ウエスタンブロッティングにより検出されるこれら蛋白質の量は、HtrA2を添加しないときと比較して減少または消失する。SHC3、CREBL1またはATF6と成熟型HtrA2との反応に被検化合物を添加し、被検化合物を添加しないときと比較してSHC3、CREBL1またはATF6の量の低減または消失が阻害される場合、該被検化合物はSHC3、CREBL1またはATF6のHtrA2による分解を阻害すると判定できる。被検化合物は予めSHC3、CREBL1またはATF6と、あるいは成熟型HtrA2と接触させ、その後、SHC3、CREBL1またはATF6と成熟型HtrA2を反応させることもできる。

[0062] また、本発明に係る化合物の同定方法は具体的には、例えば、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1とHtrA2とを共発現させた細胞を用いた細胞内プロテアーゼアッセイ(実施例3)に被検化合物を添加することにより実施できる。SHC

3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1とHtrA2との細胞での共発現は、上記のように作製したSHC3 DNA、CREBL1 DNAおよびATF6 DNAのそれぞれを含む適当なベクターとHtrA2 DNAを含む適当なベクターとを、自体公知の遺伝子工学的手法で動物細胞培養株(例えばHEK293T細胞)にトランスフェクションすることにより実施できる。SHC3、ATF6およびCREBL1は、これら蛋白質のN末またはC末にタグペプチド等が付加された蛋白質として発現させることが、これら蛋白質の検出を容易にするため、好ましい。HtrA2は、活性型HtrA2を用いる。活性型HtrA2として、成熟型HtrA2、好ましくはN末の4残基(AVPS)を欠失させた成熟型HtrA2(Δ AVPS)またはN末の4残基のうちのアラニンをグリシンに置換した成熟型HtrA2(GVPS)を用いることが適当である。成熟型HtrA2のN末の4残基(AVPS)は、アポトーシスの阻害に働くIAPs(Inhibitor of apoptosis proteins)ファミリー蛋白質との結合モチーフであり、IAPsと結合してその作用を阻害することによりカスパーゼ依存的な細胞死を促進すると報告されている。この作用は、細胞内でのプロテアーゼアッセイの検討に影響を与える可能性が考えられるため、IAPsと結合しない成熟型HtrA2(Δ AVPS)または成熟型HtrA2(GVPS)を使用することが好ましい。細胞内プロテアーゼアッセイは、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1とHtrA2とを共発現させた細胞を被検化合物と共に37℃で48時間培養後、該細胞を溶解し、その溶解液中に含まれるSHC3、CREBL1またはATF6をウエスタンブロッティングで検出することにより実施できる。ウエスタンブロッティングによる検出は、SHC3、CREBL1またはATF6に付加させたタグペプチドに対する抗体を用いて実施できる。SHC3、CREBL1またはATF6はHtrA2により分解されるため、ウエスタンブロッティングにより検出されるこれら蛋白質の量は、HtrA2を添加しないときと比較して減少または消失する。被検化合物を添加した場合のSHC3、CREBL1またはATF6の量の低減または消失が、被検化合物を添加しないときと比較して阻害される場合、該被検化合物はSHC3、CREBL1またはATF6のHtrA2による分解を阻害すると判定できる。

[0063] 本発明に係る化合物の同定方法は、上記インビトロにおけるプロテアーゼアッセイや細胞内プロテアーゼアッセイを用いた具体的例示に限定されず、一般的に用いら

れている医薬品スクリーニングにおいてよく知られている同定方法を用いて実施できる。

[0064] 本発明に係る化合物の同定方法で得られた化合物は、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解の阻害剤として利用できる。当該化合物は、生物学的有用性と毒性のバランスを考慮して選別することにより、医薬組成物として調製できる。医薬組成物の調製において、これら化合物は、単独で使用することもできるし、組合せて使用することもできる。

[0065] SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害する化合物は、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解に基づく細胞死の阻害剤に利用できる。好ましくは小胞体ストレスによる細胞死の阻害剤として有用である。より好ましくは、神経細胞死の阻害剤、さらに好ましくは小胞体ストレスによる神経細胞死の阻害剤として有用である。また、上記化合物は、脳虚血による神経細胞死の阻害剤に利用できる。さらに、これら阻害剤を用いて、小胞体ストレスによる細胞死の阻害方法を実施できる。好ましくは、小胞体ストレスや脳虚血による神経細胞死の阻害方法を実施できる。

[0066] SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害する化合物は、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解に基づく疾患の防止剤、改善剤および／または治療剤を調製できる。かかる疾患としては、例えば神経細胞死を伴う疾患、より具体的にはアルツハイマー病、パーキンソン病、ポリグルタミン病、プリオン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)等を挙げることができる。これら疾患は多くの場合、神経細胞内に異常な蛋白質が凝集体を形成していることが認められており、またこれら疾患における神経細胞死と小胞体ストレスとの関連が報告されている(非特許文献1)。また、上記化合物を用いて、このような疾患の防止方法、改善方法および／または治療方法を実施できる。

[0067] 本発明に係る疾患の防止剤、治療剤および／または改善剤は、上記化合物、上記分解阻害剤および上記細胞死阻害剤のうち少なくともいずれか1を有効成分としてその有効量含む医薬となしてもよいが、通常は、1種または2種以上の医薬用担体を用いて医薬組成物として製造することが好ましい。

- [0068] 本発明に係る医薬製剤中に含まれる有効成分の量は、広範囲から適宜選択されるが、通常約0.00001〜70重量%、好ましくは0.0001〜5重量%程度の範囲とするのが適当である。
- [0069] 医薬用担体は、製剤の使用形態に応じて一般的に使用される、充填剤、増量剤、結合剤、付湿剤、崩壊剤、滑沢剤、希釈剤および賦形剤等を例示できる。これらは得られる製剤の投与形態に応じて適宜選択して使用される。
- [0070] より具体的には、水、医薬的に許容される有機溶剤、コラーゲン、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、カルボキシビニルポリマー、アルギン酸ナトリウム、水溶性デキストラン、カルボキシメチルスターチナトリウム、ペクチン、キサントガム、アラビアゴム、カゼイン、ゼラチン、寒天、グリセリン、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ワセリン、パラフィン、ステアシルアルコール、ステアリン酸、ヒト血清アルブミン、マンニトール、ソルビトール、ラクトース等が挙げられる。これらは、本医薬組成物の剤形に応じて適宜1種類または2種類以上を組合せて使用される。
- [0071] 所望により、通常の蛋白質製剤に使用され得る各種の成分、例えば安定化剤、殺菌剤、緩衝剤、等張化剤、キレート剤、界面活性剤、およびpH調整剤等を適宜使用することもできる。
- [0072] 安定化剤は、例えばヒト血清アルブミンや通常のL-アミノ酸、糖類、セルロース誘導体等を例示できる。これらは単独でまたは界面活性剤等と組合せて使用できる。特にこの組合せによれば、有効成分の安定性をより向上させ得る場合がある。L-アミノ酸は、特に限定はなく、例えばグリシン、システイン、グルタミン酸等のいずれでもよい。糖類も特に限定はなく、例えばグルコース、マンノース、ガラクトース、果糖等の単糖類、マンニトール、イノシトール、キシリトール等の糖アルコール、ショ糖、マルトース、乳糖等の二糖類、デキストラン、ヒドロキシプロピルスターチ、コンドロイチン硫酸、ヒアルロン酸等の多糖類等およびそれらの誘導体等のいずれでもよい。セルロース誘導体も特に限定はなく、メチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム等のいずれでもよい。
- [0073] 界面活性剤も特に限定はなく、イオン性界面活性剤および非イオン性界面活性剤

のいずれも使用できる。界面活性剤には、例えばポリオキシエチレングリコールソルビタンアルキルエステル系、ポリオキシエチレンアルキルエーテル系、ソルビタンモノアシルエステル系、脂肪酸グリセリド系等が包含される。

- [0074] 緩衝剤は、ホウ酸、リン酸、酢酸、クエン酸、 ϵ -アミノカプロン酸、グルタミン酸および／またはそれらに対応する塩（例えばそれらのナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩、マグネシウム塩等のアルカリ金属塩やアルカリ土類金属塩）等を例示できる。
- [0075] 等張化剤は、塩化ナトリウム、塩化カリウム、糖類、グリセリン等を例示できる。
- [0076] キレート剤は、例えばエデト酸ナトリウム、クエン酸等を例示できる。
- [0077] 本発明に係る医薬および医薬組成物は、溶液製剤として使用できる他に、これを凍結乾燥し保存し得る状態にした後、用時、水や生理的食塩水等を含む緩衝液等で溶解して適当な濃度に調製した後に使用することもできる。
- [0078] 医薬組成物の用量範囲は特に限定されず、含有される成分の有効性、投与形態、投与経路、疾患の種類、対象の性質（体重、年齢、病状および他の医薬の使用の有無等）、および担当医師の判断等に応じて適宜選択される。一般的には適当な用量は、例えば対象の体重1kgあたり約0.01 μ g乃至100mg程度、好ましくは約0.1 μ g乃至1mg程度の範囲であることが好ましい。しかしながら、当該分野においてよく知られた最適化のための一般的な常套的実験を用いてこれらの用量の変更を行うことができる。上記投与量は1日1回乃至数回に分けて投与することができ、数日または数週間に1回の割合で間欠的に投与してもよい。
- [0079] 本発明の医薬組成物を投与するときには、該医薬組成物を単独で使用してもよく、あるいは目的の疾患の防止および／または治療に必要な他の化合物または医薬と共に使用してもよい。
- [0080] 投与経路は、全身投与または局所投与のいずれも選択できる。この場合、疾患、症状等に応じた適当な投与経路を選択する。例えば、非経口経路として、通常の静脈内投与、動脈内投与の他、皮下、皮内、筋肉内等への投与が挙げられる。あるいは経口経路で投与することができる。さらに、経粘膜投与または経皮投与も実施可能である。
- [0081] 投与形態は、各種の形態が目的に応じて選択できる。その代表的なものは、錠剤、

丸剤、散剤、粉末剤、細粒剤、顆粒剤、カプセル剤等の固体投与形態や、水溶液製剤、エタノール溶液製剤、懸濁剤、脂肪乳剤、リポソーム製剤、シクロデキストリン等の包接体、シロップ、エリキシル等の液剤投与形態が含まれる。これらは更に投与経路に応じて経口剤、非経口剤（点滴剤、注射剤）、経鼻剤、吸入剤、経膈剤、坐剤、舌下剤、点眼剤、点耳剤、軟膏剤、クリーム剤、経皮吸収剤、経粘膜吸収剤等に分類され、それぞれ通常の方法に従い、調合、成形、調製することができる。

[0082] さらに本発明は、HtrA2、HtrA2をコードするポリヌクレオチドおよびHtrA2をコードするポリヌクレオチドを含有するベクターのうちの少なくともいずれか1と、SHC3、ATF6、CREBL1、SHC3またはATF6またはCREBL1をコードするポリヌクレオチド、およびSHC3またはATF6またはCREBL1をコードするポリヌクレオチドを含有するベクターのうちの少なくともいずれか1とを含んでなるキットを提供する。当該キットは、例えば本発明に係る同定方法に使用できる。

[0083] 上記キットは、SHC3、ATF6またはCREBL1のHtrA2による分解を検出するためのシグナルおよび／またはマーカー、緩衝液、並びに塩等、必要とされる物質を含むことができる。さらに、安定化剤および／または防腐剤等の物質を含んでいてもよい。製剤化にあたっては、使用する各物質それぞれに応じた製剤化手段を導入すればよい。

[0084] 以下、本発明を実施例に基づき具体的に説明するが、本発明は下記の実施例に限定されない。

実施例 1

[0085] (HtrA2と相互作用する機能を有する蛋白質のインシリコでの探索)

HtrA2と相互作用する機能を有する蛋白質を、国際公開第WO01/67299号パンフレットに記載の予測方法に従って予測した。すなわち、HtrA2のアミノ酸配列をある長さのオリゴペプチドに分解し、各オリゴペプチドのアミノ酸配列あるいはそのアミノ酸配列と相同なアミノ酸配列を持った蛋白質をデータベース中で検索し、得られた蛋白質とHtrA2との間でローカルアライメントを行い、ローカルアライメントのスコアの高いものをHtrA2と相互作用すると予測した。

[0086] 解析の結果、HtrA2と相互作用する機能を有すると予測される蛋白質として、CR

EBL1およびSHC1を見出した。

実施例 2

[0087] (インビトロ プロテアーゼアッセイ)

CREBL1、CREBL1のファミリーであるATF6、またはSHC1のファミリーであるSHC3とHtrA2の相互作用を実験的に検証するために、インビトロにおけるプロテアーゼアッセイを実施した。

[0088] <材料およびその調製>

本実施例においては、活性型HtrA2および不活性型HtrA2としてそれぞれ、いずれもC末Tagとしてヒスチジン(His)を付加した成熟型HtrA2(配列番号4)および成熟型HtrA2(S306A)(配列番号6)を用いた。また、HtrA2と相互作用すると予想した蛋白質として、いずれもC末Tagとしてc-Mycを付加したSHC3(p64)(配列番号16)およびSHC3(p52)、並びにいずれもN末Tagとしてc-Mycを付加したCREBL1(配列番号18)およびATF6(配列番号20)を用いた。

[0089] 1. 成熟型HtrA2および成熟型HtrA2(S306A)のクローニングおよび発現プラスミドの作製

成熟型HtrA2(前駆体HtrA2(そのDNA塩基配列および該DNAによりコードされるアミノ酸配列は配列番号1および配列番号2に記載)のアミノ酸残基134-458部分)をコードする遺伝子を得るために、Human Kidney QUICK-Clone cDNA(Clontech社製)を鋳型とし、HtrA2-F1プライマー(5'側にNdeI部位とATGを付加、配列番号21)とHtrA2-RSプライマー(終止コドンを除いてXhoI部位を付加、配列番号22)およびDNAポリメラーゼとしてKOD-plus(Toyobo社製)を用いてポリメラーゼ連鎖反応法(PCR法)により成熟型HtrA2遺伝子を増幅し、pCR-BluntI-TOPOベクター(Invitrogen社製)にクローニングした。また、シーケンサー(Applied Biosystems/Hitachi:ABI3100)により塩基配列を決定した。本実施例で得られた成熟型HtrA2 DNAの塩基配列および該DNAによりコードされるアミノ酸配列をそれぞれ配列番号3および配列番号4に記載した。成熟型HtrA2大腸菌発現プラスミドは、クローニングした成熟型HtrA2の遺伝子をNdeIとXhoIで消化し、pET24bベクター(Novagen社製)に組込むことにより取得した。

[0090] 成熟型HtrA2の174番目(前駆体蛋白質(配列番号2)では306番目に相当)のセリンをアラニンに置換した変異体(成熟型HtrA2(S306A))は、プロテアーゼ活性を示さないことが報告されている。そこで、不活性型である成熟型HtrA2(S306A)の大腸菌発現プラスミドを、成熟型HtrA2発現プラスミドを鋳型とし、HtrA2-MFプライマー(配列番号23)とHtrA2-MRプライマー(配列番号24)を用いてQuikChange XL Site-Directed Mutagenesis kit(Stratagene社製)により作製した。また、シークエンサーにより塩基配列を決定した。本実施例で得られた成熟型HtrA2(S306A) DNAの塩基配列および該DNAによりコードされるアミノ酸配列をそれぞれ配列番号5および配列番号6に記載した。

[0091] 2. 成熟型HtrA2および成熟型HtrA2(S306A)の発現および精製

成熟型HtrA2大腸菌発現プラスミドを大腸菌BL21 Star(DE3)コンピテントセル(Invitrogen社製)に導入した形質転換体を取得した。この形質転換体を、26℃にて100mlのLB培地で培養し、吸光度(OD)が0.68〜0.81に達したときにイソプロピル-1-チオ-β-D-ガラクトピラノシド(IPTG)を最終濃度0.1mM添加することにより成熟型HtrA2蛋白質の発現誘導を行い、一晚培養した後、成熟型HtrA2を発現している大腸菌を遠心処理により分離回収した。得られた大腸菌を、リシスバッファ-A(Lysis buffer:リン酸緩衝生理食塩水(PBS)/1% トライトンX-100、1μg/ml ペプスタチン、5μM E64)に懸濁し、氷冷下でソニケーター(15秒×10回)により菌体を破碎した。菌体破碎液を遠心処理し(15,000rpm、30分、4℃)、可溶性画分(上清)と不溶性画分に分離した。成熟型HtrA2の含まれる可溶性画分を、あらかじめ1% トライトンX-100、リン酸緩衝生理食塩水(PBS)にて平衡化したプロボンドレジン(Invitrogen社製:1ml prepacked)に加え、4℃で30分間混和した後、洗浄バッファ(20mM リン酸ナトリウム(pH6.0)、500mM NaCl)にて3回洗浄した。レジンに吸着した成熟型HtrA2は、50、100、200、350、500mM イミダゾールをそれぞれ含む溶出バッファ(20mM リン酸ナトリウム(pH6.0)、500mM NaCl)にて段階的に溶出した。各溶出液についてSDS-PAGEを行い、成熟型HtrA2を含む画分を特定した。その結果、350〜500mM イミダゾールで成熟型HtrA2が溶出された。成熟型HtrA2を含む画分を150mM NaCl、50mM Tris-

HCl(pH7.5)に対して透析した後、遠心処理にて不溶物を除去した上清を濃縮し、牛血清アルブミン(BSA)を標準蛋白質としてクマシープラスプロテインアッセイ(Coomassie Plus Protein Assay、PIERCE社製)により蛋白質を定量した。また成熟型HtrA2(S306A)の発現および精製についても同様に行った。

[0092] 3. SHC3(p64)、SHC3(p52)、ATF6およびCREBL1のクローニングおよび発現プラスミドの作製

SHC3(p64)については、Human Brain QUICK-Clone cDNA(Clontech社製)を鋳型とし、SHC3F1プライマー(ATGの直前にBamHI部位とGCCを付加、配列番号25)とSHC3R1プライマー(終止コドンを除いてXhoI部位を付加、配列番号26)およびDNAポリメラーゼとしてKOD-plusを用いてPCR法によりSHC3(p64)遺伝子を増幅させ、pCR4Blunt-TOPOベクター(Invitrogen社製)にクローニングした。また、シーケンサーにより塩基配列を決定した。本実施例で得られたSHC3(p64) DNAの塩基配列は、GenBankにアクセッションナンバーNM_016848として既に登録された塩基配列と比較して6つの塩基に相違が認められた。相違する6塩基のうち、次の4つはゲノム配列と一致することが判明した:T173A(ValからAspへのアミノ酸の変化を伴う);G789A(アミノ酸の変化なし);A811G(ThrからAlaへのアミノ酸の変化を伴う);およびA1661G(GlnからArgへのアミノ酸の変化を伴う)。他の2つの相違する塩基は、G291CおよびA1338Gであり、これらによるアミノ酸の変化はなかった。本実施例で得られたSHC3 DNAの塩基配列および該DNAにコードされるアミノ酸配列をそれぞれ配列番号15および配列番号16に記載した。SHC3動物細胞発現プラスミドは、クローニングしたSHC3遺伝子をBamHIとXhoIで消化し、pCMV-Tag5に組み換えることにより取得した。

[0093] SHC3のスプライシングバリエーションであるSHC3(p52)は、SHC3遺伝子のコード領域内の2番目のATG(1番目のATGより360base下流)からコードされる蛋白質である。SHC3(p52)については、pCMV-Tag5AにクローニングされているSHC3(p64)プラスミドをSacIIとXhoIで消化し、SacII-XhoI断片をpCMV-Tag5Aベクターに挿入し、発現プラスミドを構築した。また発現プラスミドにSHC3(p52)遺伝子が挿入されていることを制限酵素で消化することにより確認した。

- [0094] CREBL1については、まずHuman Brain cDNAを鋳型とし、83-Fプライマー(ATGの直前にEcoRI部位とGCCを付加、配列番号27)と83-Rプライマー(終止コドンを除いてXhoI部位を付加、配列番号28)およびDNAポリメラーゼとしてKOD-plusを用いてPCR法によりCREBL1遺伝子を増幅させ、pCMV-Tag5にクローニングした。
- [0095] 次に、pCMV-Tag5に組込んだCREBL1遺伝子を鋳型とし、ATF6-NF1プライマー(ATGを除いてBamHI部位を付加、配列番号29)とATF6-NR1プライマー(終止コドンの後にXhoI部位を付加、配列番号30)およびDNAポリメラーゼとしてKOD-plusを用いてPCR法によりCREBL1遺伝子を増幅させ、pCR-BluntII-TOPOベクターにクローニングした。また、シーケンサーにより塩基配列を決定した。本実施例で得られたCREBL1 DNAの塩基配列は、GenBankにアクセッションナンバーNM_00438として既に登録された塩基配列と比較して塩基の1つに相違が認められた(T450C)。この相違によるアミノ酸の変化はなかった。また、終止コドンがTGAからTAAに変化した。これらの相違はPCRエラーではないことを確認した。本実施例で得られたCREBL1 DNAの塩基配列および該DNAにコードされるアミノ酸配列をそれぞれ配列番号17および配列番号18に記載した。CREBL1動物細胞発現プラスミドは、クローニングしたCREBL1遺伝子をBamHIとXhoIで消化し、pCMV-Tag3に組込むことにより取得した。
- [0096] ATF6については、まず、Mammary Gland QUICK-Clone cDNA(Clontech社製)を鋳型とし、ATF6Fnプライマー(配列番号31)とATF6Rnプライマー(配列番号32)およびDNAポリメラーゼとしてKOD-plusを用いてPCR法によりATF6遺伝子を増幅させた。次に、この増幅されたATF6遺伝子を鋳型とし、ATF6F1Lプライマー(ATGの直前にEcoRV siteを付加、配列番号33)とATF6R1Lプライマー(終止コドンの直後にXhoI siteを付加、配列番号34)およびDNAポリメラーゼとしてKOD-plusを用いてPCR法によりATF6遺伝子をさらに増幅させ、pCR4Blunt-TOPOベクター(Invitrogen社製)にクローニングした。また、シーケンサーにより塩基配列を決定した(配列番号19)。本実施例で得られたATF6 DNAの塩基配列は、GenBankにアクセッションナンバーNM_007348として既に登録された塩基

配列と比較して15個の塩基に相違が認められた。相違する15塩基は全てゲノム配列と一致することが判明した:T105C(アミノ酸の変化なし);T199A(LeuからMetへのアミノ酸の変化を伴う);A201G(LeuからMetへのアミノ酸の変化を伴う);C270T(アミノ酸の変化なし);A309G(アミノ酸の変化なし);C433G(ProからAlaへのアミノ酸の変化を伴う);T469C(SerからProへのアミノ酸の変化を伴う);G1228A(GlyからSerへのアミノ酸の変化を伴う);A1230C(GlyからSerへのアミノ酸の変化を伴う);C1389T(アミノ酸の変化なし);T1416C(アミノ酸の変化なし);T1491A(アミノ酸の変化なし);T1538C(ValからAlaへのアミノ酸の変化を伴う);G1540C(ValからLeuへのアミノ酸の変化を伴う);およびG1896A(アミノ酸の変化なし)。また、全てのアミノ酸の変化に関してSWISS-PROTではコンフリクトで記載がある。本実施例で得られたATF6 DNAの塩基配列および該DNAにコードされるアミノ酸配列をそれぞれ配列番号19および配列番号20に記載した。

[0097] ATF6遺伝子を動物細胞発現ベクターに組込むために、上記のpCR4Blunt-TOPOベクターにクローニングしたATF6遺伝子を鋳型とし、ATF6F2Lプライマー(ATGの直前にBglII siteを付加、配列番号35)とATF6R1Lプライマー(配列番号34)およびDNAポリメラーゼとしてKOD-plusを用いてPCR法によりATF6遺伝子を増幅し、pCR4Blunt-TOPOベクターにクローニングした。また、シーケンサーにより塩基配列を決定した(配列番号19)。このクローニングしたATF6遺伝子をBglIIとXhoIで消化し、BamHIとXhoIで消化した動物細胞発現ベクターであるpCMV-Tag 3に組込んだ。

[0098] 4. SHC3(p64)、SHC3(p52)、ATF6およびCREBL1の発現

トランスフェクション前日に細胞数 1.5×10^6 /10cm ディッシュ(Dish)としたHEK293T細胞に、SHC3(p64)、SHC3(p52)、CREBL1、ATF6の各発現プラスミドをFuGene6(Roche社製)にて導入した($10 \mu\text{g}/\text{Dish}$)。48時間後、細胞をPBSで洗浄し、1mlのリンスバッファーB(50mM Tris-HCl(pH7.6)、150mM NaCl、1% トライトンX-100、1% ノニデットP-40(NP-40)、コンプリートミニ(Complete Mini、EDTA不含))を添加し氷上で10分間静置した。その後、スクレーパーで細胞を集め、1.5mlのチューブに入れ、氷冷下でソニケーション処理(15秒×6

回)を行い、氷中で20分静置後、ピペッティングで懸濁し、遠心処理(15,000rpm、30分間、4℃)により可溶性画分と不溶性画分を分離した。検討用試料として、可溶性画分を用いた。

[0099] 5. 成熟型HtrA2および成熟型HtrA2(S306A)の活性の検討

カゼインザイモグラフィーおよびカゼインナトリウムのプロテアーゼアッセイにより成熟型HtrA2および成熟型HtrA2(S306A)の活性の検討を行った。カゼインザイモグラフィーはプロトコール(Invitrogen社製)に従って実施した。具体的には、成熟型HtrA2および成熟型HtrA2(S306A)を非還元下で2×SDS サンプルバッファーと等量混合し、室温で10分静置した後、4～16% ザイモグラム(Blue casein)ゲル(Zymogram Gel, Invitrogen社製)による分離を行った。泳動終了後、2.5% トライトンX-100にてリネーチャー(renature)した後、ディベロピングバッファー(Developing buffer)中で37℃、一晚カゼイン分解反応を行った。

[0100] 一方、カゼインナトリウムを基質としたプロテアーゼアッセイは、反応バッファー(150mM NaCl, 50mM Tris-HCl(pH7.5))中で成熟型HtrA2あるいは成熟型HtrA2(S306A)を200 μg/ml、カゼインナトリウムを400 μg/mlの濃度となるように混合し、37℃でインキュベーションして反応させることにより行った。反応開始3時間後および一晩後に反応液の一部を採取して、2×SDS サンプルバッファーと等量混合し煮沸処理後、SDS-PAGEを行い、クマシーブリリアントブルー(CBB)染色によりカゼインナトリウムの分解の有無を検出した。

[0101] 上記検討の結果、成熟型HtrA2によるカゼインの分解が認められたが、成熟型HtrA2(S306A)ではカゼインの分解が認められなかった。このことから、成熟型HtrA2はプロテアーゼ活性を有する活性型であるが、成熟型HtrA2(S306A)はプロテアーゼ活性を示さない不活性型であることが確認できた。

[0102] <方法>

可溶性画分に含まれる夾雑蛋白質の影響を除くために免疫沈降にて樹脂にそれぞれ捕捉したSHC3(p64)、SHC3(p52)、ATF6およびCREBL1を実験に用いた。SHC3(p64)、SHC3(p52)、ATF6およびCREBL1の各可溶性画分300 μlを6本のチューブ(No. 1-6)に分注し、各チューブにBSAでブロッキングした50%スラ

リーのプロテインG セファロース 4 FF (Amersham社製)を20 μ l添加し、4°Cで1時間転倒混和後、遠心処理(10,000rpm、10秒間、4°C)にて上清を回収し前処理(pre-clean)を行った。

[0103] 得られた上清に抗Myc抗体(Invitrogen社製)を1.7 μ l(2 μ g)添加し、4°Cで3時間転倒混和後に、BSAでブロッキングしたプロテインG セファロース 4 FFを20 μ l添加し4°Cで1晩転倒混和し、プロテインG セファロース 4 FFにSHC3(p64)、SHC3(p52)、ATF6およびCREBL1をそれぞれ捕捉した。つぎにSHC3(p64)、SHC3(p52)、CREBL1またはATF6が捕捉されたプロテインG セファロース 4 FFを500 μ lの洗浄バッファー(50mM Tris-HCl(pH7.5)、150mM NaCl、0.01% トライトンX-100)で5回洗浄した後、No. 1および2のチューブには50mM Tris-HCl(pH7.5)、150mM NaCl、0.01% トライトンX-100を、No. 3および4のチューブには50 μ g/mlの成熟型HtrA2溶液100 μ lを、No. 5および6のチューブには50 μ g/mlの成熟型HtrA2(S306A)溶液100 μ lをそれぞれ加えた。No. 1、3および5のチューブは37°Cで4時間、No. 2、4および6のチューブは一晩反応させた後、遠心処理により上清を除去して500 μ lの洗浄バッファーにて3回、遠心洗浄を行い、2×SDS サンプルバッファー(β -メルカプトエタノール0.1%含む)を80 μ l加え煮沸処理した。得られた試料80 μ lのうち10 μ lを使用し、SDS-PAGE後、PVDF膜へ転写し、ウェスタンブロッティングにより、SHC3(p64)、SHC3(p52)、ATF6およびCREBL1を検出した。検出用の1次抗体として抗c-Myc抗体(9E10)(Santa cruz社製)を、2次抗体としてホースラディッシュスーパーオキシダーゼ(HRP)標識した抗マウスIgG抗体(Cell Signaling社製)を用いた。また、検出はECL Western Blotting Detection System(Amersham社製)を用いて実施した。

[0104] <結果>

CREBL1、ATF6およびSHC3(p64)がいずれも、成熟型HtrA2によりインビトロで分解されることを認めた。図1-Aに示すように、活性型HtrA2とCREBL1を1晩(O/N)反応させることにより、CREBL1を示すバンドが著しく減少した。図1-Bに示すように、活性型HtrA2とATF6を4時間(4h)または1晩(O/N)反応させることに

より、ATF6を示すバンドが著しく減少した。図1-Cに示すように、活性型HtrA2とSHC3(p64)を4時間(4h)または1晩(O/N)反応させることにより、SHC3(p64)を示すバンドが著しく減少した。また、SHC3(p52)も同様に成熟型HtrA2によりインビトロで分解されることを認めた。

- [0105] 一方、不活性型HtrA2(成熟型HtrA2(S306A))によるCREBL1、ATF6およびSHC3(p64)の分解は認められなかった(図1-A、図1-Bおよび図1-C)。また、不活性型HtrA2(成熟型HtrA2(S306A))によるSHC3(p52)の分解も認められなかった。

実施例 3

- [0106] (細胞内におけるプロテアーゼアッセイ)

CREBL1、ATF6、SHC3(p64)またはSHC3(p52)とHtrA2の相互作用を細胞内におけるプロテアーゼアッセイにより検討した。

- [0107] <材料およびその調製>

成熟型HtrA2のN末の4残基(AVPS)は、アポトーシスの阻害に働くIAPs(Inhibitor of apoptosis proteins)ファミリー蛋白質との結合モチーフであり、IAPsと結合してその作用を阻害することによりカスパーゼ依存的な細胞死を促進すると報告されている。この作用は、細胞内でのプロテアーゼアッセイの検討に影響を与える可能性が考えられる。そこで成熟型HtrA2または成熟型HtrA2(S306A)とIAPsとの相互作用を阻害するために、N末の4残基(AVPS)を欠失させたもの(Δ AVPS)または該4残基のうちのアラニンをグリシンに置換したもの(AVPS→GVPS)を成熟型HtrA2および成熟型HtrA2(S306A)についてそれぞれ作製した。これら各種HtrA2はいずれもC末TagとしてFLAGを付加したものをを用いた。

- [0108] 1. 各種HtrA2の調製

成熟型HtrA2の変異体を作製するために、成熟型HtrA2を鋳型とし、センスプライマーとしてF1およびF2プライマー(ATGの直前にSacI siteを付加、それぞれ配列番号36および配列番号37)を、アンチセンスプライマーには、HtrA2-RSプライマー(配列番号22)を用い、またDNAポリメラーゼとしてPfu turbo(STRATAGENE社製)を用いてPCR法により、成熟型HtrA2(Δ AVPS)および成熟型HtrA2(

GVPS)の各遺伝子を増幅させ、pCR-BluntII-TOPOベクターにクローニングした。また、シーケンサーにより塩基配列を決定した。成熟型HtrA2(Δ AVPS)および成熟型HtrA2(GVPS)の各動物細胞発現プラスミドは、クローニングした成熟型HtrA2(Δ AVPS)および成熟型HtrA2(GVPS)の各遺伝子をSacIとXhoIで消化し、pCMV-Tag4に組込むことにより取得した。本実施例で得られた成熟型HtrA2(Δ AVPS) DNAの塩基配列および該DNAによりコードされるアミノ酸配列をそれぞれ配列番号7および配列番号8に記載した。また、成熟型HtrA2(GVPS) DNAの塩基配列および該DNAによりコードされるアミノ酸配列をそれぞれ配列番号9および配列番号10に記載した。

- [0109] 成熟型HtrA2(S306A)の変異体を作製するために、同様に、成熟型HtrA2(S306A)を鋳型とし、PCR法により、成熟型HtrA2(S306A、 Δ AVPS)および成熟型HtrA2(S306A、GVPS)の各遺伝子を増幅させ、pCR-BluntII-TOPOベクターにクローニングした。成熟型HtrA2(S306A、 Δ AVPS)および成熟型HtrA2(S306A、GVPS)の各動物細胞発現プラスミドは、クローニングした成熟型HtrA2(S306A、 Δ AVPS)および成熟型HtrA2(S306A、GVPS)の各遺伝子をSacIとXhoIで消化し、それぞれpCMV-Tag4に組込むことにより取得した。本実施例で用いた成熟型HtrA2(S306A、 Δ AVPS) DNAの塩基配列および該DNAによりコードされるアミノ酸配列をそれぞれ配列番号11および配列番号12に記載した。また、成熟型HtrA2(S306A、GVPS) DNAの塩基配列および該DNAによりコードされるアミノ酸配列をそれぞれ配列番号13および配列番号14に記載した。

[0110] 2. 各種HtrA2の酵素活性の検討

培養細胞で発現した各種HtrA2に関して、カゼインナトリウムを基質としたプロテアーゼアッセイにより、その酵素活性を測定した(実施例2参照)。その結果、成熟型HtrA2(Δ AVPS)および成熟型HtrA2(GVPS)はいずれもプロテアーゼ活性を有する活性型であること、成熟型HtrA2(S306A、 Δ AVPS)および成熟型HtrA2(S306A、GVPS)はいずれもプロテアーゼ活性を持たない不活性型であることが判明した。

[0111] 3. SHC3(p64)、SHC3(p52)、ATF6およびCREBL1の動物細胞用発現ベクタ

一の作製

実施例2と同様の方法で作製したものを用いた。

[0112] <方法>

各種HtrA2と各候補蛋白質(SHC3(p64)、SHC3(p52)、ATF6およびCREBL1)の発現プラスミドとは、トランスフェクション前日に細胞数 5×10^5 /6cm DishとしたHEK293T細胞にFuGene6(Roche社製)を用いて導入した。各種HtrA2発現プラスミドは各候補蛋白質発現プラスミドのいずれかと組合せて、いずれも $1 \mu\text{g}$ /Dish添加した。48時間後、各種HtrA2とSHC3(p64)またはSHC3(p52)とを共発現させた細胞は、 $400 \mu\text{l}$ のリシスバッファーBにより溶解し、遠心処理後、上清に $2 \times \text{SDS}$ サンプルバッファー(β -メルカプトエタノール0.1%含む)を等量加え検討用試料として用いた。一方、各種HtrA2とCREBL1またはATF6とを共発現させた細胞は、 $200 \mu\text{l}$ のリシスバッファーBに $2 \times \text{SDS}$ サンプルバッファー(β -メルカプトエタノール0.1%含む)を等量加え、ソニケーション後、煮沸処理した後に検討用試料として用いた。

[0113] 上記各検討用試料 $10 \mu\text{l}$ を用いてウエスタンブロッティングにより、SHC3(p64)、SHC3(p52)、ATF6およびCREBL1の発現、並びにこれら蛋白質の分解の有無を検出した。検出用の1次抗体として抗c-Myc(9E10)抗体を、2次抗体としてホースラディッシュペーパーオキシダーゼ(HRP)標識した抗マウスIgG抗体(Cell Signaling社製)を用いた。検出は、ECL Western Blotting Detection Systemを用いて実施した。

[0114] <結果>

プロテアーゼ活性を有する活性型変異体(成熟型HtrA2(Δ AVPS)または成熟型HtrA2(GVPS))とCREBL1とを共発現させた細胞を用いた解析では、CREBL1を示すバンドが著しく減少した(図2-Aの上図)。該活性型変異体とATF6とを共発現させた細胞を用いた解析では、ATF6を示すバンドが著しく減少した(図2-Bの上図)。該活性型変異体とSHC3(p64)とを共発現させた細胞を用いた解析では、SHC3(p64)を示すバンドが著しく減少した(図2-Cの上図)。該活性型変異体とSHC3(p52)とを共発現させた細胞を用いた解析では、SHC3(p52)を示すバンドが著しく

減少した(図2-Dの上図)。一方、不活性型HtrA2変異体(成熟型HtrA2 S306(Δ AVPS)または成熟型HtrA2 S306(GVPS))とCREBL1とを共発現させた細胞を用いた解析では、CREBL1を示すバンドの減少は認められなかった(図2-Aの上図)。該不活性型HtrA2変異体とATF6とを共発現させた細胞を用いた解析では、ATF6を示すバンドの減少は認められなかった(図2-Bの上図)。該不活性型HtrA2変異体とSHC3(p64)とを共発現させた細胞を用いた解析では、SHC3(p64)を示すバンドの減少は認められなかった(図2-Cの上図)。該不活性型HtrA2変異体とSHC3(p52)とを共発現させた細胞を用いた解析では、SHC3(p52)を示すバンドの減少は認められなかった(図2-Dの上図)。細胞内における各HtrA2変異体の発現は、各細胞間でほとんど差がなかった(図2-AおよびBの下図)。

- [0115] このように、CREBL1、ATF6、SHC3(p64)およびSHC3(p52)はいずれも、活性型の成熟型HtrA2(Δ AVPS)または活性型の成熟型HtrA2(GVPS)により細胞内で分解されることが明らかになった。一方、CREBL1、ATF6、SHC3(p64)およびSHC3(p52)はいずれも、不活性型の成熟型HtrA2(S306A、 Δ AVPS)または不活性型の成熟型HtrA2(S306A、GVPS)では分解されなかった。

実施例 4

- [0116] (HtrA2による分解パターンの検討)

CREBL1、SHC3(p64)またはSHC3(p52)のHtrA2による分解パターンを検討した。検討は、ビオチン化したCREBL1、SHC3(p64)またはSHC3(p52)を用いて、HtrA2によるインビトロ プロテアーゼアッセイにより行った。

- [0117] <材料およびその調製>

1. 成熟型HtrA2および成熟型HtrA2(S306A)

成熟型HtrA2および成熟型HtrA2(S306A)は、実施例2と同様の方法で調製したものをを用いた。

- [0118] 2. CREBL1、SHC3(p64)およびSHC3(p52)の各動物細胞発現プラスミド

CREBL1動物細胞発現プラスミドは、pCR-BluntII-TOPOベクターに実施例2と同様の方法でクローニングしたCREBL1をBamHIとXhoIで消化し、pcDNA3.1/Hisに組込むことにより取得した。

SHC3(p64)動物細胞発現プラスミドは、pCR4Blunt-TOPOベクターに実施例2と同様の方法でクローニングしたSHC3(p64)をEcoRIとXhoIで消化し、pcDNA3.1/V5-Hisに組込むことにより取得した。

SHC3(p52)動物細胞発現プラスミドは、pCMV-Tag5に実施例2と同様の方法で組込んだSHC3(p52)をPvuIIとXhoIで消化し、EcoRVとXhoIで消化したpcDNA3.1/V5-Hisにライゲーションすることにより取得した。

[0119] 3. インビトロ翻訳反応系を用いたビオチン化CREBL1、SHC3(p64)およびSHC3(p52)の調製

ビオチンで標識されたCREBL1、SHC3(p64)およびSHC3(p52)の調製は、ウサギ網状赤血球ライセート(rabbit reticulocyte lysate)を用いたインビトロ翻訳反応系($T_N T^{\text{登録商標}}$ Transcription/Translation System; Promega社製)で行った。

具体的にはまず、インビトロ翻訳反応溶液($T_N T^{\text{登録商標}}$ Quick Master Mix)40 μ lに各発現プラスミド(1 μ g/ μ l)1.5 μ l、1mM メチオニン1 μ l、ビオチン化リジンtRNA (Promega社製)1 μ l、ヌクレアーゼを含まない水(Nuclease free water)6.5 μ lを加えて全量50 μ lとし、30℃で1.5時間反応させた。その後、反応液50 μ lから12.5 μ lを採取し、2×SDS サンプルバッファーを加え煮沸処理後、ウェスタンブロットティングにより、ビオチンでラベルされたCREBL1、SHC3(p64)およびSHC3(p52)の発現を検出した。検出は、ストレプトアビジン-HRP (Promega社製)、TranscendTM Chemiluminescent substrate (TranscendTM Non-Radioactive Translation detection system; Promega社製)を用いて行った。その結果、いずれもビオチン化されていることが確認できた。

[0120] <方法>

上記反応液をプロテアーゼアッセイの試料として用いた。反応液を12.5 μ lずつ3本のチューブ(No. 2-4)に分注した。No. 2のチューブにはコントロールとして、50 mM Tris-HCl(pH7.5)、150mM NaCl、0.01% TritonX-100を25 μ l、No. 3のチューブには200 μ g/mlの成熟型HtrA2溶液を25 μ l、No. 4のチューブには200 μ g/mlの成熟型HtrA2(S306A)溶液25 μ lをそれぞれ加え混合した。

各チューブ (No. 2-4) をさらに半量ずつ分注し、1つのチューブは37℃で4時間反応し、もう一方のチューブは、37℃で一晩反応させた。反応後、各チューブに2×SDS サンプルバッファーを加え煮沸処理後、ウエスタンブロッティングにより、ビオチン化CREBL1、SHC3 (p64)、SHC3 (p52) の分解パターンを検出した。

[0121] 分解の検出は、各蛋白質内部のビオチン化されたリジン残基を指標にして、ストレプトアビジン-HRPおよびTranscendTM Chemiluminescent substrateを用いて行った。

[0122] さらに分解箇所を調べる為、ウエスタンブロッティングに用いたメンブレンから、ストレプトアビジン-HRPを除去し、各蛋白質に付加されたTagに対する抗体で、ビオチン化CREBL1、SHC3 (p64) およびSHC3 (p52) の分解パターンを検出した。SHC3の検出には、1次抗体として抗V5抗体 (Invitrogen社製) を、2次抗体としてHRP標識化抗マウスIgG抗体 (Cell Signaling社製) を用いた。CREBL1の検出には、1次抗体として抗Xpress抗体 (Invitrogen社製) を、2次抗体としてHRP標識化抗マウスIgG抗体 (Cell Signaling社製) を用いた。分解の検出は、ECL Western Blotting Detection Reagents (Amersham社製) を用いて行った。

[0123] < 結果 >

蛋白質内部のビオチン化されたリジン残基を指標に、成熟型HtrA2によるCREBL1、SHC3 (p64) またはSHC3 (p52) の分解パターンを検討した結果を、それぞれ図3-A、図3-Bおよび図3-Cに示した。また、それぞれの蛋白質のN末またはC末に付加されたTagを指標として、CREBL1、SHC3 (p64) およびSHC3 (p52) の分解パターンを検討した結果を、それぞれ図4-A、図4-Bおよび図4-Cに示した。

[0124] CREBL1については、ビオチン化されたリジン残基を指標にした分解パターンの検討において、ビオチン化CREBL1を示すバンドの著しい減少が認められ、さらに50kDa近辺にCREBL1分解産物と考えられるバンドが検出された (図3-A)。しかし、抗Tag抗体による分解パターンの検討では、図3-Aで認められた50kDa近辺のCREBL1分解産物と考えられるバンドだけでなく、別のサイズのCREBL1分解産物を示すバンドも全く検出できなかった (図4-A)。このことから、CREBL1はHtrA2により数箇所分解されたと考えられる。

- [0125] SHC3(p64)については、ビオチン化されたリジン残基を指標にした分解パターンの検討において、ビオチン化SHC3(p64)を示すバンドの著しい減少が認められ、さらに70kDa、40kDa、30kDa近辺にSHC3(p64)分解産物と考えられるバンドが検出された(図3-B)。抗Tag抗体による分解パターンの検討においても、同様のバンドが検出された(図4-B)。このことから、SHC3(p64)は、2箇所以上で成熟型HtrA2により分解された可能性がある。
- [0126] SHC3(p52)については、ビオチン化されたリジン残基を指標にした分解パターンの検討において、ビオチン化SHC3(p52)を示すバンドの著しい減少が認められたが、SHC3(p52)分解産物と考えられるバンドは検出できなかった(図3-C)。しかし、抗Tag抗体による分解パターンの検討において、40kDa近辺にSHC3(p52)分解産物と考えられるバンドが検出された(図4-C)。このことから、SHC3(p52)はHtrA2により数箇所まで分解されたと考えられる。
- [0127] このように、蛋白質内部を標識化して標識物質を検出することにより、HtrA2による上記蛋白質の分解が検出された。このことから、各蛋白質のN末またはC末に付加したTagの検出により明らかになったHtrA2による蛋白質の分解(実施例2および3)は、Tagが切断分離されたことによる見かけ上の分解ではなく、HtrA2が各蛋白質の内部に作用した結果生じた分解であることが判明した。

産業上の利用可能性

- [0128] 本発明は、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解に基づく細胞死の阻害、例えば神経細胞の細胞死の阻害、並びに神経細胞死を伴う疾患、例えば神経変性疾患の防止、治療または改善のために利用可能であり、医薬分野において非常に有用性が高い。さらにHtrA2による細胞死、例えば小胞体ストレスによる細胞死、例えば神経細胞死の解明等の研究分野にも利用できる。

配列表フリーテキスト

- [0129] 配列番号1:HtrA2前駆体蛋白質をコードするDNA。
配列番号2:HtrA2前駆体蛋白質。
配列番号3:成熟型HtrA2をコードするDNA。
配列番号4:成熟型HtrA。

配列番号5:配列番号3と同じ塩基配列であってその520位の塩基がgである塩基配列からなるポリヌクレオチド;成熟型HtrA2(S306A)をコードするDNA。

配列番号6:配列番号4と同じアミノ酸配列であって174番目のアミノ酸残基がAlaに置換したアミノ酸配列からなるポリペプチド;成熟型HtrA2(S306A)。

配列番号7:配列番号3と同じ塩基配列であってその4-15位の塩基を欠失させた塩基配列からなるポリヌクレオチド;成熟型HtrA2(Δ AVPS)をコードするDNA。

配列番号8:配列番号4と同じアミノ酸配列であって2-5番目のアミノ酸残基を欠失させたアミノ酸配列からなるポリペプチド;成熟型HtrA2(Δ AVPS)。

配列番号9:配列番号3に記載の塩基配列と同じ塩基配列であってその5位の塩基がgであるポリヌクレオチド;成熟型HtrA2(GVPS)をコードするDNA。

配列番号10:配列番号4と同じアミノ酸配列であって2番目のアミノ酸残基がGlyに置換したアミノ酸配列からなるポリペプチド;成熟型HtrA2(GVPS)。

配列番号11:配列番号5と同じ塩基配列であってその4-15位の塩基を欠失させた塩基配列からなるポリヌクレオチド;成熟型HtrA2(S306A、 Δ AVPS)をコードするDNA。

配列番号12:配列番号6と同じアミノ酸配列であって2-5番目のアミノ酸残基を欠失させたアミノ酸配列からなるポリペプチド;成熟型HtrA2(S306A、 Δ AVPS)。

配列番号13:配列番号5に記載の塩基配列と同じ塩基配列であってその5位の塩基がgであるポリヌクレオチド成熟型;HtrA2(S306A、GVPS)をコードするDNA。

配列番号14:配列番号6と同じアミノ酸配列であって2番目のアミノ酸残基がGlyに置換したアミノ酸配列からなるポリペプチド;成熟型HtrA2(S306A、GVPS)。

配列番号15:SHC3をコードするDNA。

配列番号16:SHC3。

配列番号17:CREBL1をコードするDNA。

配列番号18:CREBL1。

配列番号19:ATF6をコードするDNA。

配列番号20:ATF6。

配列番号21:配列番号3に記載の塩基配列に基づいて、成熟型HtrA2 DNAを取

得するために設計されたプライマー用ポリヌクレオチド。

配列番号22:配列番号3に記載の塩基配列に基づいて成熟型HtrA2 DNAを取得するために設計されたプライマー用ポリヌクレオチド。

配列番号23:配列番号3に記載の塩基配列に基づいて、成熟型HtrA2(S306A) DNAを取得するために設計されたプライマー用ポリヌクレオチド。

配列番号24:配列番号3に記載の塩基配列に基づいて、成熟型HtrA2(S306A) DNAを取得するために設計されたプライマー用ポリヌクレオチド。

配列番号25:配列番号15に記載の塩基配列に基づいて、SHC3 DNAを取得するために設計されたプライマー用ポリヌクレオチド。

配列番号26:配列番号15に記載の塩基配列に基づいて、SHC3 DNAを取得するために設計されたプライマー用ポリヌクレオチド。

配列番号27:配列番号17に記載の塩基配列に基づいて、CREBL1 DNAを取得するために設計されたプライマー用ポリヌクレオチド。

配列番号28:配列番号17に記載の塩基配列に基づいて、CREBL1 DNAを取得するために設計されたプライマー用ポリヌクレオチド。

配列番号29:配列番号17に記載の塩基配列に基づいて、CREBL1 DNAを取得するために設計されたプライマー用ポリヌクレオチド。

配列番号30:配列番号17に記載の塩基配列に基づいて、CREBL1 DNAを取得するために設計されたプライマー用ポリヌクレオチド。

配列番号31:配列番号19に記載の塩基配列に基づいて、ATF6 DNAを取得するために設計されたプライマー用ポリヌクレオチド。

配列番号32:配列番号19に記載の塩基配列に基づいて、ATF6 DNAを取得するために設計されたプライマー用ポリヌクレオチド。

配列番号33:配列番号19に記載の塩基配列に基づいて、ATF6 DNAを取得するために設計されたプライマー用ポリヌクレオチド。

配列番号34:配列番号19に記載の塩基配列に基づいて、ATF6 DNAを取得するために設計されたプライマー用ポリヌクレオチド。

配列番号35:配列番号19に記載の塩基配列に基づいて、ATF6 DNAを取得する

ために設計されたプライマー用ポリヌクレオチド。

配列番号36:配列番号3に記載の塩基配列に基づいて、成熟型HtrA2(Δ AVPS)

DNAを取得するために設計されたプライマー用ポリヌクレオチド。

配列番号37:配列番号3に記載の塩基配列に基づいて、成熟型HtrA2(GVPS)

DNAを取得するために設計されたプライマー用ポリヌクレオチド。


請求の範囲

- [1] SHC3(サーク ホモロジー 2 ドメイン コンテイニング トランスフォーミング プロテイン C3、src homology 2 domain containing transforming protein C 3)、ATF6(アクティベーター トランスクリプション ファクター 6、activating transcription factor 6)およびCREBL1(サイクリックAMP レスポンス エLEMENT バインディング プロテイン ライク 1、cAMP responsive element binding protein-like 1)のうちの少なくとも1のHtrA2(ハイ テンペレイチャー リクワイアメント プロテイン A2、high temperature requirement protein A2)による分解を阻害することを特徴とする神経細胞死阻害方法。
- [2] SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害する化合物を1つ以上用いることを特徴とする神経細胞死阻害方法。
- [3] 神経細胞死が脳虚血による神経細胞死である請求項1または2に記載の神経細胞死阻害方法。
- [4] SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害することを特徴とする脳虚血障害または神経変性疾患の防止方法、治療方法または改善方法。
- [5] 神経変性疾患がアルツハイマー病、パーキンソン病、ポリグルタミン病、プリオン病または筋萎縮性側索硬化症である請求項4に記載の防止方法、治療方法または改善方法。
- [6] SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害する化合物の同定方法であって、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を可能にする条件下、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1とHtrA2とを化合物と接触させ、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1を検出することができるシグナルおよび／またはマーカーを使用する系を用いて、このシグナルおよび／またはマーカーの存在若しくは不存在および／または変化を検出することにより、化合物が、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1の分解を阻害するか否かを決定することを特徴とする同定方法。
- [7] SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害する


化合物の同定方法であって、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を可能にする条件下、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1とHtrA2とを化合物と接触させ、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1の存在若しくは不存在の検出および／またはその量の変化の測定により、あるいは、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1の分解物の存在若しくは不存在の検出および／またはその量の変化の測定により、化合物が、SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1の分解を阻害するか否かを決定することを特徴とする同定方法。

- [8] SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害する化合物を1つ以上含んでなる神経細胞死阻害剤。
- [9] 神経細胞死が脳虚血による神経細胞死である請求項8に記載の神経細胞死阻害剤。
- [10] SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害する化合物を1つ以上含んでなる脳虚血障害または神経変性疾患の防止剤、治療剤または改善剤。
- [11] 神経変性疾患がアルツハイマー病、パーキンソン病、ポリグルタミン病、プリオン病または筋萎縮性側索硬化症である請求項10に記載の神経変性疾患の防止剤、治療剤または改善剤。
- [12] HtrA2、HtrA2をコードするポリヌクレオチドおよびHtrA2をコードするポリヌクレオチドを含有するベクターのうちの少なくともいずれか1と、SHC3、ATF6、CREBL1、並びにSHC3、ATF6およびCREBL1のいずれか1をコードするポリヌクレオチド、並びにSHC3、ATF6およびCREBL1のいずれか1をコードするポリヌクレオチドを含有するベクターのうちの少なくともいずれか1とを含んでなる試薬キット。


[図1-A]




[図1-B]




[図1-C]




[図2-A]




[図2-B]




[図2-C]




[図2-D]




[図3-A]




[図3-B]




[図3-C]




[図4-A]



[図4-B]



[図4-C]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/014378

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ A61K45/00, A61P9/10, A61P21/00, A61P25/16, A61P25/28,
C12Q1/37, C12N15/12, C12N15/57, G01N33/15, G01N33/50

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ A61K45/00, A61P9/10, A61P21/00, A61P25/16, A61P25/28,
C12Q1/37, C12N15/12, C12N15/57, G01N33/15, G01N33/50

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CAPLUS (STN), MEDLINE (STN), EMBASE (STN), BIOSIS (STN),
JSTPLUS (JOIS), JST7580 (JOIS), JMEDPLUS (JOIS)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 03/027145 A1 (The Institute of Physical and Chemical Research (RIKEN)), 03 April, 2003 (03.04.03), Full text (Family: none)	6, 7, 12
A	SUZUKI, Y. et al., A Serine Protease, HtrA2, Is Released from the Mitochondria and Interacts with XIAP, Inducing Cell Death, 2001, Molecular Cell, Vol.8, pages 613 to 621, full text	6, 7, 12

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
27 October, 2004 (27.10.04)

Date of mailing of the international search report
22 November, 2004 (22.11.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/014378

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	RAMESH HEGDE et al., Identification of Omi/HtrA2 as a Mitochondrial Apoptotic Serine Protease That Disrupts Inhibitor of Apoptosis Porotein-Caspase Interaction, The Journal of Biological Chemistry, 2002, Vol.277, No.1, pages 432 to 438, full text	6,7,12
A	L.MIGUEL MARTINS et al., The Serine Protease Omi/HtrA2 Regulates Apoptosis by Binding XIAP through a Reaper-like Motif, The Journal of Biological Chemistry, 2002, Vol.277, No.1, pages 439 to 444, full text	6,7,12
A	Yasuyuki SUZUKI, Ryosuke TAKAHASHI, "Mitochondria Yurai no Shinki Saiboshi Yudo Inshi": HtrA2/Omi, Experimental Medicine, 2002, Vol.20, No.1, pages 73 to 75, full text	6,7,12
A	RANDAL J. KAUFMAN, Orchestrating the unfolded protein response in health and disease, The Journal of Clinical Invention, 2002, Vol.110, No.10, pages 1389 to 1398, full text	6,7,12
A	Takashi KUDO, "Shohotai Stress to Shinkei Hensei Shikkan", Nihon Shinkei Seishin Yakuri Gakkai Zasshi, 2003, Vol.23, pages 105 to 109, full text	6,7,12
A	HAZE K. et al., Identification of hte G13(cAMP-response-element-binding protein-related protein) gene product related to activating transcription factor 6 as a transcriptional activator of the mammalian unfolded protein response, Biochemical Journal, 2001, Vol.355, pages 19 to 28, full text	6,7,12
A	LUCIANO CONTI et al., Shc signaling in differentiating neural progenitor cells, Nature Neuroscience, 2001, Vol.4, No.6, pages 579 to 586, full text	6,7,12
A	Takeshi NAKAMURA, Nozomu MORI, "Rinsanka Tylosin Keiro no Adapter Bunshi Shc Family no Tayo na Kino to Shinkeikei deno Aratana Tenkai", Seikagaku, 2001, Vol.73, No.11, pages 1322 to 1325, full text.	6,7,12

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/014378

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☒ Claims Nos.: 1-5
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
Claims 1 to 5 relate to methods of inhibiting nerve cell death, which seemingly involve methods for treatment of the human body by therapy, and thus relate to a subject matter which this International Searching Authority is not required, under the provisions of (continued to extra sheet)
2. ☒ Claims Nos.: 8-11
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
(See extra sheet.)
3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
- ☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/014378

Continuation of Box No.II-1 of continuation of first sheet(2)

Article 17(2) (a) (i) of the PCT and Rule 39.1 (iv) of the Regulations under the PCT, to search.

Continuation of Box No.II-2 of continuation of first sheet(2)

The compounds as set forth in claims 8 to 11 are specified by a property "inhibiting the degradation of at least one of SHC3, ATF6 and CREBL1 by HtrA2" and, therefore, involve any compounds having this property. However, no specific compound having this property is presented in the description. Thus, claims 8 to 11 are neither disclosed in the meaning within PCT Article 5 nor supported by the disclosure in the description in the meaning within PCT Article 6. Even though the common technical knowledge at the point of the application is taken into consideration, it is completely unknown what compounds are involved in the scope and what are not. Thus, the above claims are extremely unclear and do not comply with the requirement of clearness in the meaning within PCT Article 6 too.

Such being the case, no meaningful search can be made on the inventions as set forth in the above claims.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ A61K 45/00, A61P 9/10, A61P 21/00, A61P 25/16,
A61P 25/28, C12Q 1/37, C12N 15/12, C12N 15/57,
G01N 33/15, G01N 33/50

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ A61K 45/00, A61P 9/10, A61P 21/00, A61P 25/16,
A61P 25/28, C12Q 1/37, C12N 15/12, C12N 15/57,
G01N 33/15, G01N 33/50

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

CAPLUS (STN), MEDLINE (STN), EMBASE (STN), BIOSIS (STN),
JSTPLUS (JOIS), JST7580 (JOIS), JMEDPLUS (JOIS)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	WO 03/027145 A1 (理化学研究所 (RIKEN)), 2003. 04. 03, 全文 (ファミリーなし)	6, 7, 12
A	SUZUKI Y. et al., A Serine Protease, HtrA2, Is Released from the Mitochondria and Interacts with XIAP, Inducing Cell Death, 2001, Molecular Cell, Vol.8, p.613-621, 全文	6, 7, 12

☒ C欄の続きにも文献が列举されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的な技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

27. 10. 2004

国際調査報告の発送日

22.11.2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

新留 素子

4 P

3436

電話番号 03-3581-1101 内線 3490

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	RAMESH HEGDE et al., Identification of Omi/HtrA2 as a Mitochondrial Apoptotic Serine Protease That Disrupts Inhibitor of Apoptosis Porotein-Caspase Interaction, The Journal of Biological Chemistry, 2002, Vol.277, No.1, p.432-438, 全文	6, 7, 1 2
A	L. MIGUEL MARTINS et al., The Serine Protease Omi/HtrA2 Regulates Apoptosis by Binding XIAP through a Reaper-like Motif, The Journal of Biological Chemistry, 2002, Vol.277, No.1, p.439-444, 全文	6, 7, 1 2
A	鈴木泰行、高橋良輔, ミトコンドリア由来の新規細胞死誘導因子: HtrA2/Omi, 実験医学, 2002, Vol.20, No.1, p.73-75, 全文	6, 7, 1 2
A	RANDAL J. KAUFMAN, Orchestrating the unfolded protein response in health and disease, The Journal of Clinical Invention, 2002, Vol.110, No.10, p.1389-1398, 全文	6, 7, 1 2
A	工藤 喬, 小胞体ストレスと神経変性疾患, 日本神経精神薬理学会雑誌, 2003, Vol.23, p.105-109, 全文	6, 7, 1 2
A	HAZE K. et al., Identification of hte G13(cAMP-response-element-binding protein-related protein) gene product related to activating transcription factor 6 as a transcriptional activator of the mammalian unfolded protein response, Biochemical Journal, 2001, Vol.355, p.19-28, 全文	6, 7, 1 2
A	LUCIANO CONTI et al., Shc signaling in differentiating neural progenitor cells, Nature Neuroscience, 2001, Vol.4, No.6, p.579-586, 全文	6, 7, 1 2
A	中村岳史、森望, リン酸化チロシン経路のアダプター分子Shcファミリーの多様な機能と神経系での新たな展開, 生化学, 2001, Vol.73, No.11, p.1322-1325, 全文	6, 7, 1 2

第Ⅱ欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)

法第8条第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. ☒ 請求の範囲 1-5 は、この国際調査機関が調査することを要しない対象に係るものである。
つまり、
請求の範囲 1-5 は、神経細胞死阻害方法であるが、該方法には人体の治療方法も包含されると認められるから、PCT17条(2)(a)(i) 及びPCT規則39.1(iv) の規定により、この国際調査機関が調査することを要しない対象に係るものである。
2. ☒ 請求の範囲 8-11 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
特別ページに記載
3. ☐ 請求の範囲 _____ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a) の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

第Ⅲ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。

1. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. ☐ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。

<第II欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 2. について>

請求の範囲8-11に記載の化合物は、「SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害する」という性質によって特定されており、該性質を有するあらゆる化合物を包含するものである。しかしながら、明細書には、該性質を有する化合物としての具体的なものが一切記載されていないから、請求の範囲8-11は、PCT第5条の意味での開示を欠き、また、PCT第6条の意味での明細書の開示による裏付けを欠いている。さらに、出願時の技術常識を勘案しても具体的にどのような化合物が包含され、どのような化合物が包含されないのかが全く不明であって、前記請求の範囲は著しく不明確であり、PCT第6条における明確性の要件も欠いている。

したがって、前記クレームに記載された発明について有意義な調査をすることができな